

BORMAX**10 l (13,75 kg)**

Použití len v prípade skutočnej potreby.
 Neprekročť dávkovanie.

HNOJIVO-EÜ

PFC 1(C) (II) (a): Jednozložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny

Hnojivo s obsahom mikroživiny v roztoku
 11 % bór (B) 150 g/l, vo vode rozpustný
 (B) (11)

Výrobok obsahuje 4,75 % dusík (N).

Zložky: Reakčné produkty monoetanolamínu a kyseliny boritej (1:3)¹
 (EC 701-024-0)

¹CMC 1: Pôvodné látky a zmesi

Hodnota pH: 7 - 8

Ekologické poľnohospodárstvo: BORMAX spĺňa požiadavky nariadenia (EÚ) 2018/848 a je schválený pre ekologické poľnohospodárstvo.

Výrobca: Hechenbichler GmbH

Cusanusweg 7-9, A-6020 Innsbruck, Rakousko

Tel.: +43 512 29 18 10 - 0 | www.hechenbichler.com

Dovozca: AMALGEROL SK s.r.o.

Fraňa Kráľa 35, 811 05 Bratislava

Tel.: +420 724 726 597 | www.amalgerol.sk

Pokyny

Bezpečnosť: Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

Po manipulácii starostlivo umyte ruky. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare tváre. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky, a je to možné,

odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Pokračujte ve vyplachovaní. PO POŽITÍ: vypláchnite ústa a piť veľa vody. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. Pri zdravotných problémoch

volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

Skladovania: udržiavať obaly tesne uzavreté a uchovávať na chladnom, dobre vetranom mieste. Odporúčaná skladovacia teplota: Hodnota +5 °C až +25 °C. Chráňte pred mrazom, teplom, slnečným žiarením. Uchovávať oddelene od potravín a krmív. Uchovávať mimo dosahu detí a domácich zvierat.

Likvidácia: Zabráňte vzniku odpadov alebo pokiaľ je to možné, zaistíte minimalizáciu odpadov. Nesmie sa odstraňovať spoločne s odpadmi z domácnosti. Nepripustiť únik do kanalizácie. Odstránenie v súlade s lokálnymi a národnými predpismi.

BORMAX**Oblasti použitia**

Používať len pri skutočnej potrebe. Odporúčané aplikačné množstvo sú priemerné hodnoty z praxe. Pre exaktné nasadenie odporúčame pôdne, popr. listovú analýzu. Stanovené aplikačné množstvo nesmie byť prekročené. Neaplikovať pri extrémnom počasi (pri veľkom teple alebo pri nebezpečnom mraze). Aplikovať len pri neporušenej voskovej vrstve listov.

Aplikačné množstvo na hektár: Min. množstvo vody 300 l

Aplikácia na pôdu (u všetkých kultúr): 5 l/ha pred výsevom popr. výsadbou

Repka: 3 l na začiatku predlžovacieho rastu, pri nedostatku aplikácií opakovať cca po 10 - 14 dňoch

Cukrovka: 3 l pri 6 - listovom štádiu, pri nedostatku aplikácií opakovať cca po 10 - 14 dňoch

Kukurica: 3 l v 4 - 10 listovom štádiu

Slnečnica: 2 - 3 l od 4 - 6 listového štádia

Tekvica: 3 l pred uzavretím riadkov, množstvo vody 400 - 600 l

Strukoviny: 2 l v 10 - 15 cm-štádiu, pri nedostatku aplikácií opakovať po cca 10 - 14 dňoch

Bobuloviny: 1 l v štádiu tvorby pukov, pri nedostatku aplikácií opakovať po cca 10 - 14 dňoch, množstvo vody 500 - 1000 l

Jadroviny a kôstkoviny: 1 l pred kvetom popr. po kvete, 2 l po zbere pred zožitím listov, množstvo vody 500 - 1000 l

Zemiaky: 3 l od uzavretia riadkov pri ošetroení fungicídmí, pri nedostatku aplikácií opakovať po 10 - 14 dňoch

Zelenina: na kultúry so zvýšenou potrebou bóru napr. karotka, kapusta, paradajky: 2 - 3 aplikácie s 2 l, pri zelere vždy 3 l pre aplikáciu, odstup medzi aplikáciami 10 - 14 dní, množstvo vody min. 500 l

Vinič: 1 l pred kvetom popr. po kvete, množstvo vody 300 - 500 l

Chmeľ: 3 l od polovicnej výšky konštrukcie, množstvo vody 500 - 1000 l



www.amalgerol.sk

BORMAX | SK | 140 x 150 mm
 Label version: 13.02.2025, 16:49

AMALGEROL SK
 POSILUJE PŮDU, RASTLINY, ZVÍŘATÁ

