

MG-LSA 
10 l (13,2 kg)

EU: PFC 1 (C)(I)(b)(i): Jednozložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny

N (Mg) - 6,3 (9)

6,3 % celkový dusík (N) 84 g/l

6,3 % dusičnanový dusík

9 % oxid horečnatý (MgO) 120 g/l, rozpustný vo vode

Zložky:

Magnesium nitrate¹ (CAS-Nr. 10377-60-3)

¹CMC 1: Pôvodné látky a zmesi

Kvapalina v roztoku.

Hodnota pH (1 % roztok): 4,7

Evidenčné číslo: EU0291

Výrobca/Zabalil: Hechenbichler GmbH

Cusanusweg 7-9, 6020 Innsbruck, Rakusko

Tel.: +43 512 291810 - 0 | www.hechenbichler.com

Dovozca: AMALGEROL SK s.r.o.

Fraňa Kráľa 35, 811 05 Bratislava

Tel.: +420 724 726 597 | www.amalgerol.sk

Bezpečnostné pokyny: Zabrániť kontaktu s pokožkou a očami, nevdychovať a neprehliť. Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Noste ochranné rukavice, ochranné okuliare. Po práci si umyť ruky. V prípade nehody ihneď konzultovať s lekárom. Pri zasiahnutí očí, okamžite vypláchnuť. Pri vdýchnutí alebo prehltnutí vypláchnuť ústa a veľa sa napiť, nevyvolávať zvracanie.

Skladovania: udržiavať obaly tesne uzavreté a uchovávať na chladnom, dobre vetranom mieste. Odporúčaná skladovacia teplota: Hodnota +5 °C až +25 °C. Chráňte pred mrazom, teplom, slnečným žiarením. Uchovávať oddelene od potravín a krmív. Uchovávať mimo dosahu detí a domácich zvierat.

Likvidácia obalov: Podľa možností úplne využiť. Neškodnite obsah a nádobu v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

MG-LSA 

POKYNY

Hnojivo na použitie v poľnohospodárstve a záhradníctve. Len na profesionálne použitie. Na zásobenie rastliny horčikom cez list. Použiť len pri skutočnej potrebe. Odporúčané aplikčné množstvo sú priemerné hodnoty z praxe. Na exaktné použitie odporúčame pôdne popr. listovú analýzu. Stanovené aplikčné dávky nesmú byť prekročené. MG-LSA aplikovať skoro ráno alebo večer. Neaplikovať pri extrémnom počasí (napr. pri vysokých teplotách alebo mraze). Striekať len pri nepoškodenej voskovej vrstve listu. Nepoužívať na kultúry pod sklom/fóliou.

Pomaly zamiešať do cisterny naplnenej do polovice vodou, úplne rozpustiť, doplniť cisternu a striekať. Počas celej doby postreku miešať. Pred aplikáciou MG-LSA bezpodmienečne vykonať skúšku miešateľnosti a znášanlivosti s ochrannými prostriedkami a preparátmi iných výrobcov. Dbáť pri miešaní pokynov všetkých výrobcov. Nosieť ochranný odev. Nevdychovať postrekovú hmlu! Aplikátory riadne vyčistiť pred aj po aplikácii.

ODPORÚČANÉ APLIKÁCIE

Aplikčné množstvo na hektár: Minimálne množstvo vody pri aplikácii je 200 l/h.

Obilniny: 1 - 2 l od 3-listového štádia (BBCH 13), pri potrebe opakovať v rozmedzí 10 - 14 dní. U pšenice pre dodatočné zlepšenie kvality opakovať od tvorby vlajkového listu až do doby pred kvitnutím (BBCH 39 - 59).

Zemiaky: 1 - 2 l akonáhle bude dostatočné olistenie pre prím, pri potrebe opakovať v rozmedzí 10 - 14 dní.

Zelenina, Cukrová Repa, Kapusta: 1 - 2 l od 6 rastového štádia (BBCH 16) alebo na základe výsledkov u listovej analýzy, pri potrebe opakovať v rozmedzí 10 - 14 dní.

Jadroviny a Kôstkoviny: 1 - 2 l od opadávanie okvetných lístkov (BBCH 69), pri potrebe až 3-krát opakovať v rozmedzí 21 dní.

www.amalgerol.sk
MG-LSA | SK | 160x150 mm
Label version: 18.04.2025 12:16

AMALGEROL SK 
POSILUJE PŮDU, RASTLINY, ZVÍŘATÁ