

ZINKCHELAT

10 l (13 kg)

HNOJIVO EÚ
EU: PFC1 (C) (II) (a): Jednozložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživín
Hnojivo s obsahom mikroživín vo forme chelátu

7,2 % zinok (Zn) 94 g/l, ako EDTA-Chelat, vo vode rozpustný (Zn) (7,2)

Zloženie: Diammonium [[N,N'-ethylenbis[N-(carboxylatomethyl)glycinato]](4-)-N,N',O,O',ON,ON']²⁻ zinkate(2-)¹⁻ (CAS-Nr. 67859-51-2)
¹CMC1: Pôvodné látky a zmesi

Hodnota pH: 6 - 7

Výrobca/Zabíal: Hechenbichler GmbH
Cusanusweg 7-9, 6020 Innsbruck, Rakousko
Tel.: +43 512 29 18 10 - 0 | www.amalgerol.sk

Dovozca: AMALGEROL SK s.r.o.
Fraňa Kráľa 35, 811 05 Bratislava
Tel.: +420 724 726 597 | www.amalgerol.sk

Číslo šarže:

Bezpečnostné opatrenia: Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami, nevychýjajte a neprehltajte. Počas práce nejedzte, nepite a nefajčite. Po použití si umyte ruky. Noste ochranný odev a ochranné okuliare. V prípade nehody okamžite vyhľadajte lekára. V prípade kontaktu s očami ich okamžite vypláchnite vodou. Pri vdýchnutí alebo požití vypláchnite ústa a vypite veľké množstvo vody, nevyvolávajte zvracanie.

Skladovanie: Skladovať v originálnom balení v dobre vetraných priestoroch pri teplote +5 °C až +25 °C. Chrániť pred mrazom, horúcou a slnečným žiarením. Obal musí byť vždy tesne uzavretý. Skladovať oddelene od potravín a krmív. Uchovávať mimo dosahu detí.

Likvidácia: Ak je to možné, využite ju v plnej miere. Nepoužitý zvyšok zlikvidujte v súlade s miestnymi a vnútroštátnymi predpismi. Riadne vyprázdnite obaly od zvyškov a odovzdajte ich do zberu.

ZINKCHELAT

POKYNY

Používajte ho len vtedy, keď je to skutočne potrebné. Odporúčané aplikačné dávky sú priemerné hodnoty z praxe. Na presnú aplikáciu sa odporúča analýza pôdy alebo listov. Uvedené aplikačné dávky sa nesmú prekročiť. Nepoužívajte za extrémnych poveternostných podmienok (napr. vysoká teplota alebo riziko mrazu). Postrekujte len vtedy, keď je vosková vrstva listov neporušená. Nepoužívajte na kultúry pod sklom a fóliou.

ODPORÚČANÉ APLIKÁCIE

Hnojivo na použitie v poľnohospodárstve a záhradníctve.

Pred použitím obsah riadne pretrepte! Pomaly vmiešajte do cisterny naplnenej do polovice vodou, úplne rozpusťte, doplňte cisternu vodou a postriekajte. Miešajte počas celého obdobia postreku! Pred použitím nášho výrobku s ochrannými prostriedkami a prípravkami iných výrobcov sa musí bezpodmienečne vykonať skúška miešateľnosti a tolerance. Pri miešaní je potrebné dodržiavať pokyny všetkých výrobcov. Pred aplikáciou a po nej postrekovať riadne vyčistite.

Aplikačná dávka na hektár: Množstvo postrekovej vody min. 200 l/ha.

Obilniny: 1 l pri vzhádzaní (BBCH rastová fáza 20 - 30), 1 - 3 l na začiatku tvorby klasu (BBCH 40), opakovať pri strednom až vysokom nedostatku medzi 10 - 14 dňami.

Zemiaky: 1 liter od vzhádzania (BBCH 10), opakujte pri strednom až vysokom nedostatku medzi 10. a 14. dňom.

Mak: 1 l pred štádiom kvetného puku (BBCH 50)

Kukurica: 1 l od štádia 4 - 8 listov (BBCH 14 - 18)

Cukrová repa, strukoviny, kapusta: 1 l od štádia 6 listov (BBCH 16), opakujte o 10 - 14 dní pri strednom až vysokom nedostatku.

Chmeľ: 1 l v 3 - 5 dávkach od kvitnutia.

Víní, kôstkoviny a jadroviny: 1 l medzi pučaním a kvitnutím, v prípade potreby



www.amalgerol.sk

ZINKCHELAT | SK | 160x125mm
Label version: 30.01.2023, 12:23

AMALGEROL SK 
POSTILUJE PŮDU, RASTLINY, ZVÍŘATÁ